

HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenentwicklung!

Vorteile:

- sehr hohes Ertragspotenzial: beste Bewertungen in Korn- und Rohproteinерtrag (7/8)
- frühere Blüte: Vorteile in der Ertragsbildung bei Fröhsommertrockenheit
- verbesserte Erntbarkeit durch weniger Wipfelknicken und kürzere Pflanzenlänge
- vicin- und convicinarm

Anbau:

gute Eignung für die Fütterung sowie Lebensmittelverarbeitung

Mit einem praxisüblichen Tausendkorngewicht (BSA-Note 6) eignet sich HAMMER lvc für alle Drilltechniken im konventionellen und ökologischen Anbau.

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/fröh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Kornertrag							7		
Blühbeginn				4					
Standfestigkeit								8	
Rohproteinерtrag								8	
Rohproteingehalt				4					

HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenentwicklung!

Nabelfarbe	weiß
------------	------

Entwicklung:

Blühbeginn				4					
Reife					5				
Pflanzenlänge						6			

Vitalität:

Standfestigkeit								8	
Botrytis						6			
Rost					5				

Ertrag und Qualität:

Kornertrag							7		
TKM						6			
Rohproteinertrag								8	
Rohproteingehalt				4					
Tanningehalt	tanninhaltig								

HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenentwicklung!

Aussaat:

Saatzeit Im Frühjahr so früh wie möglich, Befahrbarkeit des Bodens ist entscheidend.

Saatstärke (keimfähige Samen/m²)

günstige Saatbedingungen	35-40
normale Saatbedingungen	40-45
ungünstige Saatbedingungen	50-55

Saattiefe (cm)

leichte Böden	8-10 cm
schwere Böden	6-8 cm

Düngung:

Kalkung zur leguminose auf bodenarttypischen pH-Wert

Grunddüngung nach Entzug: z. B. mittlere Bodenversorgung und mittleres Ertragsniveau: 40-60 kg P₂O₅; 100-130 kg/ha K₂O; 20-50 kg/ha MgO

Stickstoff keine N-Düngung

Spurenelemente nach Bedarf in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen

Pflanzenschutz:

Pflanzenschutz in Abstimmung mit dem örtlichen Pflanzenschutzdienst

Unkraut / Ungras Herbizidanwendungen sind im Vor- und Nachauflauf möglich. Mechanische Unkrautbekämpfung ist gut möglich.

Schädlinge Auf die Schwarze Bohnenlaus zu Blühbeginn und auf den Ackerbohnenkäfer zur Mitte Blüte achten. Ggf. Behandlung einplanen.

Krankheiten Schokoladenfleckigkeit ist bei Auftreten mit Fungiziden gut kontrollierbar.

Ernte gute Druscheignung durch gleichmäßige Abreife und gute Standfestigkeit

HAMMER lvc

Klarer Treffer in der Sortenentwicklung!

Vergleich der vicin-/convicinarmen Sorten



Vergleich der vicin-/convicinarmen Sorten

© LfL

© LfL