

# ZORRO Schwarzhafer

Lukrative Spezialität für Pferdehalter



## Vorteile:

- erster Schwarzhafer mit mittlerem Ertragspotenzial
- violettschwarzes Korn mit erhöhtem Anthozyangehalt und überdurchschnittlichem Hektolitergewicht
- mittelfrühe Kornabreife bei verzögerter Strohabreife, gute Blattgesundheit
- überdurchschnittliche Toleranz gegenüber Befall mit Fusarium und Flugbrand

## Anbau:

lukrative Absatzmöglichkeiten als begehrte Spezialität für Pferdehalter  
 rechtzeitige, dünnere Aussaat  
 verhaltene N-Düngung  
 ausreichend dosierter Wachstumsreglereinsatz

## Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Druschreife	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Standfestigkeit	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Mehltau	█	█	█	█	█	█	█	█	█

## Qualität

Sortierung >2,0 mm	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Entspelzbarkeit	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Feinspelzigkeit	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Hektolitergewicht	█	█	█	█	█	█	█	█	█

# ZORRO Schwarzhafer

Lukrative Spezialität für Pferdehalter

## Entwicklung:

Rispenstücken	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Druschreife	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Korn-Stroh-Abreife	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Pflanzenlänge	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Rispen/m <sup>2</sup>	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Körner/Rispe	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
TKM	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

## Vitalität:

Standfestigkeit	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Knickfestigkeit	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

## Gesundheit:

Gesundheit	Sehr breite Resistenzausstattung gegen Blattkrankheiten, überdurchschnittliche Toleranz gegenüber Befall mit Fusarium und Flugbrand								
Mehltau	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Kronenrost	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Blattflecken	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Septoria	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

## Qualität:

Qualität	Glänzendes, violettschwarzes kompaktes Korn								
Sortierung >2,0 mm	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Entspelzbarkeit	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Hektolitergewicht	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████
Feinspelzigkeit	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████	████████

# ZORRO Schwarzhafer

## Lukrative Spezialität für Pferdehalter

Anbauregionen	Hoch lukrativ für Haferanbauer mit Direktvermarktung an Pferdehalter
Fruchtfolge	Hafer hat einen sehr hohen Vorfruchtwert, vergleichbar frühräumenden Blattfrüchten

### Aussaat:

Aussaat	Rechtzeitige Aussaat anstreben
Saatzeittoleranz	früh, Ende Februar~normal, Mitte März

### Saatstärke (keimf. Kö/m<sup>2</sup>):

frühe Saat	etwas geringer, z.B. 270-280
mittlere Saat	etwas geringer, z.B. 280-300
späte Saat	etwas geringer, z.B. 300-330
frühe Saat	ortsüblich, z.B. 280-300
mittlere Saat	ortsüblich, z.B. 300-330
späte Saat	ortsüblich, z.B. 330-360

### N-Düngung:

Mittlere Ertragserwartung : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 130 (Vorfrucht Getreide)

#### Startgabe

EC 00 - 13: 120 inkl. N<sub>min 0-60</sub> mit 10 - 15 S

Hohe Ertragserwartung : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 150 (Vorfrucht Getreide)

#### Startgabe

EC 00 - 13: 120 inkl. N<sub>min 0-60</sub> mit 10 - 15 S

#### Schossgabe

EC 30 - 32: 20 - 40 bei geringer Nachlieferung

### Wachstumsregler:

(in üppigen Beständen) z. B. 1,5 - 1,8 l/ha CCC720 in EC 32/39

### Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittel, Termine und Aufwandmengen **Herbizide**: empfohlene Mittel möglichst frühzeitig (EC 13/21)  
**Insektizide**: (Warnhinweise beachten) gegebenenfalls rechtzeitig gegen BYDV-Haferröte  
**Fungizide**: (kombiniert mit WR) i.d.R. nicht wirtschaftlich  
 schlagspezifisch)