


viterra® Zwischenfrucht-Mischung

LUNDSGAARDER GEMENGE ÖKO



...Winterharte Gras-Leguminosen-Mischung zur Futternutzung



Vorteile:

- Geeignet als Winterzwischenfrucht zur Gründüngung und Bodenverbesserung oder zur Futterproduktion
- Ausgewogene Kombination aus Stickstoffmehrern und -zehrern wirkt sich positiv auf Pflanzenwachstum und Bodenleben aus
- Welsches Weidelgras nutzt Wachstumsphasen über Winter
- Winterwicke und Winterfuttererbse sind wertvolle Eiweißkomponenten im Futter
- Erhöhung des agrarökologischen Wertes durch großes Blütenangebot

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Gew.-%	29 % Inkarnatklee
	31 % Welsches Weidelgras
	20 % Winterfuttererbse
	20 % Winterwicke

ohne Kreuziferen, mit Leguminosen, winterhart

viterra® Zwischenfrucht-Mischung

LUNDSGAARDER GEMENGE ÖKO



...Winterharte Gras-Leguminosen-Mischung zur Futternutzung

Nutzung:

- Gründüngung
- Eignung zur Biogas- / Futternutzung
- Humusaufbau
- Erosionsschutz
- Stickstoffanreicherung

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	++
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Intensivkulturen	
Leguminosen	

Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering

gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Erosionsschutz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Humusaufbau	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kälte- und Frostresistenz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Trockentoleranz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Anbau:

viterra® Zwischenfrucht-Mischung

LUNDSGAARDER GEMENGE ÖKO



...Winterharte Gras-Leguminosen-Mischung zur Futternutzung

Empfohlene Aussaatstärke	50 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Ende August bis Mitte September oder im Frühjahr als Untersaat in Mais - Standort berücksichtigen!
Düngung	Bei langjährig organischer Düngung nicht notwendig
Pflanzenschutz	Nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Als Grünfutter mit Ladewagen, zur Silagenutzung mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase
Erntetermin	April bis Anfang Mai