

viterra® Zwischenfrucht-Mischung

# SOMMERFUTTER A2

... Futtermischung für die Ernte im Anbaujahr



### Vorteile:

- Zusammensetzung wie empfohlene Qualitätsstandardmischung A2
- Liefert als Sommerzwischenfrucht zusätzliches hochwertiges Futter
- Kombination aus Einjährigem- und Welschem Weidelgras liefert gut strukturiertes Futter für Wiederkäuer
- Das massewüchsige Welsche Weidelgras ermöglicht eine Winterbegrünung nach der Ernte
- Hoher Vorfruchtwert durch gute Durchwurzelung und Garezustand des Bodens
- Mit Perserklee ist die Mischung als **viterra® SOMMERFUTTER** erhältlich

### Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Gew.-%	33 % Einjähriges Weidelgras
	67 % Welsches Weidelgras

ohne Kruziferen, ohne Leguminosen, winterhart

# SOMMERFUTTER A2

... Futtermischung für die Ernte im Anbaujahr



### Nutzung:

Gründüngung  
Eignung zur Biogas- / Futternutzung  
Humusaufbau  
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung  
Erosionsschutz

### Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen

Mais	++
Getreide	++
Raps	++
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Intensivkulturen	
Leguminosen	+

### Agronomische Merkmale:

schlecht / früh / kurz / gering

gut / spät / lang / hoch

Unkrautunterdrückung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Erosionsschutz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Humusaufbau	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Trockentoleranz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

### Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	40 - 45 kg/ha
Saattiefe	2 - 4 cm
Aussaatperiode	Ende Juni bis Ende Juli (zur Begrünung bis Ende August)
Düngung	Startgabe für bessere Anfangsentwicklung wird empfohlen. Relevanter Leguminosenanteil laut DüV: 0 %
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat
Ernte	Als Grünfutter und Silage mit Ladewagen oder Häcksler nach Anwelkphase
Erntetermin	Oktober