

# BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge, vital und gute Qualität

Vorteile:

- sehr leistungsfähig mit sehr hoher Anpassungsfähigkeit
- Auffallend vital und bestockungsfreudig: BORDEAUX kombiniert mittlere Reife und Standfestigkeit mit ausgezeichneter Knickfestigkeit.
- großes Korn mit sehr hohem Marktwareanteil und hohem Hektolitergewicht

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang

|               |  |  |   |   |  |  |  |  |
|---------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Ährenschieben |  |  |   | 5 |  |  |  |  |
| Reife         |  |  |   | 5 |  |  |  |  |
| Pflanzenlänge |  |  | 4 |   |  |  |  |  |

Neigung zu

|              |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Lager        |  |   | 4 |  |  |  |  |  |
| Halmknicken  |  |   | 4 |  |  |  |  |  |
| Ährenknicken |  | 3 |   |  |  |  |  |  |

Anfälligkeiten

|                         |    |  |   |   |   |  |  |  |
|-------------------------|----|--|---|---|---|--|--|--|
| Mehltau                 |    |  |   | 5 |   |  |  |  |
| Ramularia               |    |  |   |   | 6 |  |  |  |
| Zwergrost               |    |  |   | 5 |   |  |  |  |
| Netzflecken             |    |  | 4 |   |   |  |  |  |
| Resist. Gelbmosaikvirus | ja |  |   |   |   |  |  |  |

Ertragsaufbau

|                    |   |  |  |  |  |   |  |   |
|--------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Bestandesdichte    |   |  |  |  |  |   |  | 9 |
| Kornzahl / Ähre    | 1 |  |  |  |  |   |  |   |
| TKM                |   |  |  |  |  | 7 |  |   |
| Kornertrag Stufe 1 |   |  |  |  |  | 7 |  |   |
| Kornertrag Stufe 2 |   |  |  |  |  | 7 |  |   |
| Marktwareanteil    |   |  |  |  |  | 7 |  |   |
| Vollgersteanteil   |   |  |  |  |  | 7 |  |   |
| Hektolitergewicht  |   |  |  |  |  | 7 |  |   |

# BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge, vital und gute Qualität

Eiweißgehalt (Futter)



# BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge, vital und gute Qualität

## Entwicklung und Ertrag:

|                    |                                                    |  |  |   |   |  |   |  |   |
|--------------------|----------------------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|
| Entwicklung        | Mittlere Reife nach sehr vitaler Jugendentwicklung |  |  |   |   |  |   |  |   |
| Ährenschieben      |                                                    |  |  |   | 5 |  |   |  |   |
| Reife              |                                                    |  |  |   | 5 |  |   |  |   |
| Pflanzenlänge      |                                                    |  |  | 4 |   |  |   |  |   |
| Bestandesdichte    |                                                    |  |  |   |   |  |   |  | 9 |
| Kornzahl / Ähre    | 1                                                  |  |  |   |   |  |   |  |   |
| TKM                |                                                    |  |  |   |   |  | 7 |  |   |
| Kornertrag Stufe 1 |                                                    |  |  |   |   |  | 7 |  |   |
| Kornertrag Stufe 2 |                                                    |  |  |   |   |  | 7 |  |   |

## Vitalität und Gesundheit:

|                         |                                |  |  |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Winterfestigkeit        |                                |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| Trockentoleranz         |                                |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Standfestigkeit         |                                |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Halmstabilität          |                                |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Ährenstabilität         |                                |  |  |   |   |   | 7 |  |  |
| Gesundheit              | Knapp mittlere Blattgesundheit |  |  |   |   |   |   |  |  |
| Resist. Gelbmosaikvirus | ja                             |  |  |   |   |   |   |  |  |
| Rhynchosporium          |                                |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| Ramularia               |                                |  |  | 4 |   |   |   |  |  |
| Zwergrost               |                                |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| Netzflecken             |                                |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Mehltau                 |                                |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| undef. Blattflecken     |                                |  |  | 4 |   |   |   |  |  |

# BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge, vital und gute Qualität

Qualität:

| Qualität              | Zweijährig hohe Hektolitergewichte bei guter Sortierung |  |  |  |  |  |   |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Marktwareanteil       |                                                         |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Vollgersteanteil      |                                                         |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Hektolitergewicht     |                                                         |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Eiweißgehalt (Futter) | 1                                                       |  |  |  |  |  |   |  |  |

# BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge, vital und gute Qualität

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Anbauregionen                 | Alle Standorte                                             |
| Saatzeittoleranz (zweizeilig) | früh, z.B. 20. September~etwas später, z.B. Anfang Oktober |

### Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Saatstärke (Körner / m <sup>2</sup> ) | ortsüblich in Abhängigkeit von Saatzeit, Standort und Bestellbedingungen |
| frühe Saat (zweizeilig)               | etwas erhöht, z.B. 260-280                                               |
| mittlere Saat (zweizeilig)            | etwas erhöht, z.B. 280-320                                               |
| späte Saat (zweizeilig)               | etwas erhöht, z.B. 320-360                                               |

### N-Düngung:

schossbetont : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 190 (Vorfrucht Getreide, sehr hohes Ertragsniveau)

#### Herbstgabe

bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen (nach Getreide bis 1. Okt. 20 – 40, organisch bis 30 NH<sub>4</sub>)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 80 - 90 inkl. N<sub>min 0-30</sub> mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

#### Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 80 inkl. N<sub>min 30-90</sub>, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 39 - 49: 30 - 40, Trockenstandorte EC 39

### Wachstumsregler im Intensivanbau:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Wachstumsreglerbedarf | etwas höher |
|-----------------------|-------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise zum Pflanzenschutz | Im Hinblick auf die herausragende Ertragsleistung bei knapp mittlerer Blattgesundheit empfiehlt sich BORDEAUX für eher intensivere Anbauverfahren mit einer gesplitteten bzw. zweigeteilten Fungizidstrategie. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge, vital und gute Qualität

LSV 2023

## BORDEAUX in den LSV D-Süd 2023

Qualität: Marktware und HL-Gewicht, Wintergersten mit > 300 ha ang. Vermehrungsfläche 2023



Quelle: nach Angaben der LELF Brandenburg  
02.05.2024


33



LSV 2023

## BORDEAUX in den LSV D-Süd 2023

Qualität: Marktware und HL-Gewicht, Wintergersten mit > 300 ha ang. Vermehrungsfläche 2023



Quelle: nach Angaben der LELF Brandenburg  
02.05.2024

33



# BORDEAUX zweizeilig

Top-Erträge, vital und gute Qualität