

# SU JULE mehrzeilig

Ertrag + Qualität + Standfestigkeit

Vorteile:

- mittelspäter Einzelähren-Typ
- herausragende Kombination von hoher Ertragsleistung, sehr guter Strohstabilität und ausgezeichneter Kornqualität
- hohe und sichere Erträge auch in trockenen Jahren
- Vermarktungsqualität sehr hoch und sicher mit TKM "7", Marktwareanteil „7“ und Hektolitergewicht „6“.
- ertragsstabil durch gute Kornausbildung

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz, 9 = sehr hoch/spät/lang

|               |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Ährenschieben |  |  |  |  | 5 |   |  |  |  |
| Reife         |  |  |  |  | 5 |   |  |  |  |
| Pflanzenlänge |  |  |  |  |   | 6 |  |  |  |

Neigung zu

|              |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Lager        |  |  | 3 |   |  |  |  |  |  |
| Halmknicken  |  |  | 3 |   |  |  |  |  |  |
| Ährenknicken |  |  |   | 4 |  |  |  |  |  |

Anfälligkeiten

|                         |    |  |  |   |   |   |  |  |  |
|-------------------------|----|--|--|---|---|---|--|--|--|
| Mehltau                 |    |  |  |   |   | 6 |  |  |  |
| Ramularia               |    |  |  | 4 |   |   |  |  |  |
| Zwergrost               |    |  |  |   | 5 |   |  |  |  |
| Netzflecken             |    |  |  |   | 5 |   |  |  |  |
| Resist. Gelbmosaikvirus | ja |  |  |   |   |   |  |  |  |

Ertragsaufbau

|                    |  |  |  |   |   |  |   |  |  |
|--------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
| Bestandesdichte    |  |  |  | 4 |   |  |   |  |  |
| Kornzahl / Ähre    |  |  |  |   | 5 |  |   |  |  |
| TKM                |  |  |  |   |   |  | 7 |  |  |
| Kornertrag Stufe 1 |  |  |  |   |   |  | 7 |  |  |
| Kornertrag Stufe 2 |  |  |  |   |   |  | 7 |  |  |
| Marktwareanteil    |  |  |  |   |   |  | 7 |  |  |

# SU JULE mehrzeilig

Ertrag + Qualität + Standfestigkeit



# SU JULE mehrzeilig

Ertrag + Qualität + Standfestigkeit

## Entwicklung und Ertrag:

|                    |                                                          |  |  |   |   |   |   |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Entwicklung        | zügige Jungendentwicklung, verlängerte Kornfüllungsphase |  |  |   |   |   |   |  |  |
| Ährenschieben      |                                                          |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| Reife              |                                                          |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| Pflanzenlänge      |                                                          |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Bestandesdichte    |                                                          |  |  | 4 |   |   |   |  |  |
| Kornzahl / Ähre    |                                                          |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| TKM                |                                                          |  |  |   |   |   | 7 |  |  |
| Kornertrag Stufe 1 |                                                          |  |  |   |   |   | 7 |  |  |
| Kornertrag Stufe 2 |                                                          |  |  |   |   |   | 7 |  |  |

## Vitalität und Gesundheit:

|                         |                                                                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Winterfestigkeit        |                                                                                       |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Trockentoleranz         |                                                                                       |  |  |   |   |   | 7 |  |  |
| Standfestigkeit         |                                                                                       |  |  |   |   |   | 7 |  |  |
| Halmstabilität          |                                                                                       |  |  |   |   |   | 7 |  |  |
| Ährenstabilität         |                                                                                       |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Gesundheit              | mittlere Blattgesundheit, bei sehr hoher Ertragserwartung zweimaliger Fungizideinsatz |  |  |   |   |   |   |  |  |
| Resist. Gelbmosaikvirus | ja                                                                                    |  |  |   |   |   |   |  |  |
| Rhynchosporium          |                                                                                       |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Ramularia               |                                                                                       |  |  |   |   | 6 |   |  |  |
| Zwergrost               |                                                                                       |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| Netzflecken             |                                                                                       |  |  |   | 5 |   |   |  |  |
| Mehltau                 |                                                                                       |  |  | 4 |   |   |   |  |  |
| undef. Blattflecken     |                                                                                       |  |  |   |   | 6 |   |  |  |

# SU JULE mehrzeilig

Ertrag + Qualität + Standfestigkeit

Qualität:

|                       |  |   |  |  |  |   |   |  |  |
|-----------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|
| Markwareanteil        |  |   |  |  |  |   | 7 |  |  |
| Vollgersteanteil      |  |   |  |  |  |   | 7 |  |  |
| Hektolitergewicht     |  |   |  |  |  | 6 |   |  |  |
| Eiweißgehalt (Futter) |  | 2 |  |  |  |   |   |  |  |

# SU JULE mehrzeilig

Ertrag + Qualität + Standfestigkeit

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anbauregionen                 | Empfehlung für uneingeschränkt alle Anbaulagen      |
| Saatzeittoleranz (mehrzeilig) | normal, z.B. 20. September~spät, z.B. Mitte Oktober |

### Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| frühe Saat (mehrzeilig)    | ortsüblich, z.B. 220-240 |
| mittlere Saat (mehrzeilig) | ortsüblich, z.B. 240-260 |
| späte Saat (mehrzeilig)    | ortsüblich, z.B. 260-290 |

### N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 190 (Vorfrucht Getreide, sehr hohes Ertragsniveau)

#### Herbstgabe

bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen (nach Getreide bis 1. Okt. 20 – 40, organisch bis 30 NH<sub>4</sub>)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 80 - 90 inkl. N<sub>min</sub> 0-30 mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

#### Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 80 inkl. N<sub>min</sub> 30-90, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 39 - 49: 30 – 40, Trockenstandorte EC 39

### Wachstumsregler im Intensivanbau:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Wachstumsreglerbedarf | etwas geringer |
|-----------------------|----------------|

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise zum Pflanzenschutz | Bei hoher Ertragserwartung lohnt eine zweimalige Fungizidbehandlung in EC 32 und EC 49 zur rechtzeitigen Kontrolle von Netzflecken und Zwergrost. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SU JULE mehrzeilig


Ertrag + Qualität + Standfestigkeit

## Strohstabilität SU JULE

### Strohstabilität marktbedeutender Winterfuttergersten (mz)



Neigung zu Lager, Halm- und Ährenknicken lt. Beschr. Sortenliste 2022



20.04.2023

Sorten zur Aussaat 2023


9

Strohstabilität SU JULE

### Strohstabilität marktbedeutender Winterfuttergersten (mz)



Neigung zu Lager, Halm- und Ährenknicken lt. Beschr. Sortenliste 2022



20.04.2023

Sorten zur Aussaat 2023

9

# SU JULE mehrzeilig

Ertrag + Qualität + Standfestigkeit

**SU JULE in den LSV NRW 2018, PS0-Parzelle**



©Schulze Kremer

© Schulze Kremer

# SU JULE mehrzeilig

Ertrag + Qualität + Standfestigkeit

SU JULE in den LSV NRW 2018, PS0-Parzelle

©Schulze Kremer

