

# SALAMANCA

Hohe Standfestigkeit, verlässlich im Protein



## Vorteile:

---

- sehr gute Standfestigkeit (Lagerneigung "2") kombiniert mit guter Pflanzenlänge
- hervorragende Beerntbarkeit, hohe Anbausicherheit
- gute Wüchsigkeit während der Jugendphase

## Anbau:

---

Durch sehr hohen Proteinerträge eignet sich die Sorte sehr gut für die Verwendung in der Mastfütterung. SALAMANCA hat eine breite Anbauempfehlung in ganz Europa und bringt auch sehr gute Ergebnisse in Öko-Versuchen.

# SALAMANCA

Hohe Standfestigkeit, verlässlich im Protein

## Entwicklung:

|               |             |             |             |              |              |             |              |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Blühbeginn    | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div>4</div> | <div></div>  | <div></div> | <div></div>  | <div></div> | <div></div> |
| Blühdauer     | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>  | <div>5</div> | <div></div> | <div></div>  | <div></div> | <div></div> |
| Reife         | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div>4</div> | <div></div>  | <div></div> | <div></div>  | <div></div> | <div></div> |
| Pflanzenlänge | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>  | <div></div>  | <div></div> | <div>7</div> | <div></div> | <div></div> |

## Vitalität Und Gesundheit:

|                 |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Standfestigkeit | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div>8</div> | <div></div> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|

## Ertrag und Qualität:

|                  |             |             |             |             |             |              |              |              |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| TKM              | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div>6</div> | <div></div>  | <div></div>  | <div></div> |
| Kornertrag       | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>  | <div></div>  | <div>8</div> | <div></div> |
| Rohproteintrag   | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>  | <div>7</div> | <div></div>  | <div></div> |
| Rohproteingehalt | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div>6</div> | <div></div>  | <div></div>  | <div></div> |
| Druscheignung    | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div>  | <div></div>  | <div>8</div> | <div></div> |

# SALAMANCA

Hohe Standfestigkeit, verlässlich im Protein

## Aussaat:

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussaat                               | Abstand 10,5 -30 cm (Verrankung muss gewährleistet sein)                                                   |
| Saatzeit                              | Ab Anfang März; optimalen Bodenzustand abwarten (ortsübliche Erfahrungen berücksichtigen)                  |
| Saatstärke (Körner / m <sup>2</sup> ) | früh: 65-75 keimf. Körner pro qm<br>mittel: 70-80 keimf. Körner pro qm<br>spät: 75-90 keimf. Körner pro qm |
| Saattiefe                             | Leichte Böden ca. 6 cm, schwere Böden ca. 4 cm<br>Größere Aussaattiefe für besseren Wasseranschluss        |

## Düngung:

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalkung        | Zur Leguminose auf bodenarttypischen pH-Wert                                                                                             |
| Grunddüngung   | Nach Entzug: Bodenversorgung und Ertragsniveau mittel: 45 kg/ha P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ; 120 kg/ha K <sub>2</sub> O; 30 kg/ha MgO |
| Stickstoff     | Keine, Ausnahme: nur bei sehr verarmten Böden 20-30 kg/ha N über schwefelhaltigen Ammonium-Dünger                                        |
| Spurenelemente | Nach Bedarf in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen z. B. 1 kg/ha Mn-Sulfat + 2-3 kg/ha Solubor + 10 kg/ha Bittersalz                 |

## Pflanzenschutz:

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflanzenschutz   | In Abstimmung mit dem örtlichen Pflanzenschutzdienst                                                                |
| Unkraut / Ungras | Herbizidanwendungen sind im Vor- und Nachauflauf möglich.                                                           |
| Schädlinge       | Auf Blattrandkäfer (Auflaufphase), Grüne Erbsenlaus (Blühbeginn) achten; im Einzelfall ggfs. Behandlung einplanen   |
| Krankheiten      | Botrytis cinerea (Grauschimmel) ist bei Auftreten mit Fungiziden gut kontrollierbar; Saatgutbeizung wird empfohlen. |

|       |                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernte | Gute bis sehr gute Druscheignung durch gute Standfestigkeit und hohe Bestände bei Reife; Ernte bei 16-19 % Kornfeuchte; Gefahr von Bruchkörnern bei zu später Ernte; schonende Mähdreschereinstellung |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SALAMANCA

Hohe Standfestigkeit, verlässlich im Protein

## Ertragsleistung von SALAMANCA LSV 2012 2013

### Ertragsleistung von SALAMANCA in den LSV 2012 und 2013



|                             | 2013         |              |                             | 2012         |              |                             |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|                             | Hessen       | Bayern       | Baden-Wü./<br>Rheinl.-Pfalz | Hessen       | Bayern       | Baden-Wü./<br>Rheinl.-Pfalz |
| VSD Ertrag dt/ha (= 100)    | 52,7         | 55,6         | 56,5                        | 52,9         | 54,7         | 51,5                        |
| <b>SALAMANCA</b> St. 2 rel. | <b>101,1</b> | <b>106,0</b> | <b>100,2</b>                | <b>111,0</b> | <b>102,0</b> | <b>109,5</b>                |

1.06.2014

nach Daten der Länderdienststellen

1

Ertragsleistung von SALAMANCA LSV 2012 2013

### Ertragsleistung von SALAMANCA in den LSV 2012 und 2013



|                             | 2013         |              |                             | 2012         |              |                             |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|                             | Hessen       | Bayern       | Baden-Wü./<br>Rheinl.-Pfalz | Hessen       | Bayern       | Baden-Wü./<br>Rheinl.-Pfalz |
| VSD Ertrag dt/ha (= 100)    | 52,7         | 55,6         | 56,5                        | 52,9         | 54,7         | 51,5                        |
| <b>SALAMANCA</b> St. 2 rel. | <b>101,1</b> | <b>106,0</b> | <b>100,2</b>                | <b>111,0</b> | <b>102,0</b> | <b>109,5</b>                |

1.06.2014

nach Daten der Länderdienststellen

1

# SALAMANCA

Hohe Standfestigkeit, verlässlich im Protein