

Ölrettich
BENTO

Vermindert die virusbedingte Eisenfleckigkeit



Vorteile:

- **BENTO** unterbricht die Übertragung des Tobacco Rattle Virus durch die *Trichodorus*-Nematoden
- Die kraftvolle Anfangsentwicklung unterdrückt Unkräuter durch Licht-, Wasser- und Nährstoffentzug wirkungsvoll
- Hoher Eintrag organischer Masse als zusätzlicher Beitrag zur Humusbildung
- Idealer Schutz vor Wind- und Wassererosion und Verbesserung der Bodenstruktur durch eine intensive Durchwurzelung des Bodens
- Besonders geeignet als Zwischenfrucht vor Kartoffeln

Sorteneigenschaften: (nach offiziellen Prüfungen o. in Anlehnung an das Bundessortenamt)

	schlecht / früh / kurz / gering				gut / spät / lang / hoch			
Massebildung im Anfang								
Neigung zum Blühen								
Standfestigkeit								

Ölrettich
BENTO

Vermindert die virusbedingte Eisenfleckigkeit

Nutzung:

- Verminderung von TRV
- Gründüngung
- Wasserschutz / Stickstoffkonservierung
- Mulchsaat
- Humusaufbau
- Erosionsschutz
- Biofumigation

Fruchtfolgeeignung:

+ geeignet / ++ besonders empfohlen	
Mais	++
Getreide	++
Raps	+
Zuckerrüben	
Kartoffeln	++
Intensivkulturen	+
Leguminosen	++

Agronomische Merkmale:

	schlecht / früh / kurz / gering	gut / spät / lang / hoch
Unkrautunterdrückung	■■■■■■■■■■	
Erosionsschutz	■■■■■■■■■■	■
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	■■■■■■■■■■	■
Humusaufbau	■■■■■■■■■■	■
Kälte- und Frostresistenz	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
Trockentoleranz	■■■■■■■■■■	■
Wurzeltyp	Pfahlwurzel	
Maximale Durchwurzelungstiefe	180 cm	

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	18 – 25 kg/ha
Saattiefe	2 - 3 cm
Aussaatperiode	Mitte Juli bis Mitte August - Standort berücksichtigen!
Düngung	40 - 60 kg N/ha
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat nach sorgfältiger Bodenbearbeitung fördert die schnelle und gleichmäßige Entwicklung des Ölrettichs