### Der offiziell empfohlene Sommerdurum



### Vorteile:

- mehrjährig ertragstabil in allen Regionen
- blatt- und ährengesund
- Trockentoleranz: höchster Ertrag im Dürrejahr 2018

### Anbau:

Aus den Landessortenversuchen für Sommerdurum heraus offiziell empfohlen.





## Der offiziell empfohlene Sommerdurum

Entwicklung:	
Entwicklung	Die frühzeitige Abreife sorgt auch bei Trockenstress für eine gesichertere, gute Kornausbildung.
Ährenschieben	
Druschreife	5
Pflanzenlänge	7
Ähren/m²	
Körner/Ähre	6
TKM	
Kornertrag Stufe 1	7
Kornertrag Stufe 2	6

### Vitalität und Gesundheit:

Standfestigkeit				5				
Gesundheit	Die gute Blatto	jesundheit ma	cht die Sc	orte auch f	ür den Öl	kolandbau	ı attraktiv.	
Gelbrost						7		
Fusariumresistenz			4					
Mehltau				5				
Braunrost				5				
Blattseptoria					6			



## Der offiziell empfohlene Sommerdurum

Qualität:	
Qualität	Die niedrige Mineralstoffwertzahl trägt zu einer guten Vermahlungseigenschaft bei.
Rohproteingehalt	6
Neigung zu Dunkelfleckigkeit	4
Gelbpigmentgehalt	6
Kochpotenzial	6
hl-Gewicht	
Glasigkeit	
Fallzahl	5
Farbton Teigware	
Sortierung	6

Version: 16.01.2024 / 37.00

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG



### Der offiziell empfohlene Sommerdurum

Anbauregionen Mittlere und bessere Böden in warmen und sommertrockenen Durumlagen

#### **Aussaat:**

Aussaat Ende Februar bis Anfang April

Saatzeittoleranz Sommerdurum sollte so früh wie möglich gedrillt werden

ungünstige Bedingungen  $400 - 450 \text{ K/m}^2$ günstige Bedingungen  $370 - 400 \text{ K/m}^2$ 

#### **N-Düngung:**

standortüblich: Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 180 (Blattvorfrucht, mittelhohes Ertragsniveau)

Startgabe

EC 13 - 25: 60 - 80 inkl.  $N_{min\ 0-30}$  mit 10 - 15 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 50 - 70, üppige Bestände EC 32

Spätgabe

EC 49 - 59: 40 - 60 (mit ca. 10 S), Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler (nach § 18b)

Ohne Ausnahmeregelung erlaubt ist Moddus mit einer Aufwandmenge von bis zu 0,6 l/ha in EC 31-39 (§18 PflSchG). Besonders zu den späteren Anwendungstermine genügen deutlich geringere Aufwandmengen.

### Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch)

#### Fungizidbehandlung:

Blattbehandlung vorrangig gegen Mehltau ab EC 32; Fusariumabwehr EC 59-63 mit den empfohlenen Präparaten

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

Гel: +49 511/726 66-0 Fax: +49 511/726 66-100 E-Mail: service@saaten-union.de

Version: 16.01.2024 / 37.00



## Der offiziell empfohlene Sommerdurum

#### **Qualität Duralis**

© Offizielle Sortenwertprüfungen des Bundessortenamtes; \*2020-2021; \*\*2021-2022



Chiana (minata sorraniamentalinnan nas minnassorraniamental 1997)

© Offizielle Sortenwertprüfungen des Bundessortenamtes; \*2020-2021; \*\*2021-2022

Qualität Duralis

© Offizielle Sortenwertprüfungen des Bundessortenamtes; \*2020-2021; \*\*2021-2022






### Der offiziell empfohlene Sommerdurum

#### **Qualität Duralis**


©MRI





### Der offiziell empfohlene Sommerdurum

Qualität Duralis ©MRI



Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

SAATEN
UNION
Züchtung ist Zukunft

Tel: +49 511/726 66-0 Fax: +49 511/726 66-100 E-Mail: service@ saaten-union.de Version: 16.01.2024 / 37.00

### Der offiziell empfohlene Sommerdurum

#### Vitalität Duralis

© Quelle: Offizielle Sortenwertprüfungen des Bundessortenamtes; \*2020-2021; \*\*2021-2022



© Quelle: Offizielle Sortenwertprüfungen des Bundessortenamtes; \*2020-2021; \*\*2021-2022

Vitalität Duralis

© Quelle: Offizielle Sortenwertprüfungen des Bundessortenamtes; \*2020-2021; \*\*2021-2022





### Sommerdurum

# **DURALIS**

Der offiziell empfohlene Sommerdurum

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

SAATEN
UNION
Züchtung ist Zukunft

Version: 16.01.2024 / 37.00