

SPÄTHS ALBRUBIN

Anthocyanhaltiger Rotdinkel - einzigartig auf dem Dinkelmarkt!



Vorteile:

- Rotdinkel mit Anthocyan-Gehalt (ca. 0,05 g/kg)
- Anthocyane wirken antioxidativ
- stabilste Fallzahl
- hohe Kernaussbeute

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

Entwicklung



Neigung zu



Anfälligkeiten



Qualität



SPÄTHS ALBRUBIN

Anthocyanhaltiger Rotdinkel - einzigartig auf dem Dinkelmarkt!

Entwicklung:

Ährenschieben			3						
Reife					5				
Pflanzenlänge				4					
Ähren/m²							7		
Kernzahl/Ähre					5				
TKM				4					
Vesenertrag Stufe 1				4					
Vesenertrag Stufe 2				4					

Vitalität & und Gesundheit:

Standfestigkeit			3						
Gesundheit	Gute Resistenz gegen Blattseptoria (APS 3)								
Braunrost					5				
Mehltau				4					

Qualität:

Rohproteingehalt					5				
Mehlausbeute T 630					5				
Kernausbeute								8	
Sedimentationswert						6			
Fallzahl								8	

SPÄTHS ALBRUBIN

Anthocyanhaltiger Rotdinkel - einzigartig auf dem Dinkelmarkt!

Aussaart:

Aussaart	Ende September bis Ende Oktober
Frühsaat	entspelzt: 270-290 Kö/m ² (ca. 130-150 kg/ha), nicht entspelzt: 160-180 Vesen/m ² (ca. 160-180 kg/ha)
Spätsaat	entspelzt: 300-320 Kö/m ² (ca. 150-170 kg/ha), nicht entspelzt: 160-180 Vesen/m ² (ca. 190-210 kg/ha)

N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 170 (Blattvorfrucht, mittelhohes Ertragsniveau

Startgabe

EC 13 - 25: 50 - 70 inkl. N_{min} 0-30 mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 40 - 60 inkl. N_{min} 0-60

Spätgabe

EC 47 - 49: 30 - 40, Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler (im Intensivanbau, z.B.):

(Pflanzenentwicklung, Standort und Witterung berücksichtigen)	ortsüblich, im Intensivanbau (hohe N-Versorgung) Vorbehandlung nötig und zu EC 32-39 z. B. 0,4 l Moddus oder 0,6 kg Prodax
---	--

Pflanzenschutzempfehlung:


(Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch)	Es genügt in der Regel ein breitenwirksames Fungizid ab EC 39 vor allem gegen Mehltau. Bei hohem Infektionsdruck ist ein Splitting in EC 32-37 und EC 49-51 sinnvoll. SPÄTHS ALBRUBIN ist eingeschränkt CTU-verträglich (bis 1000 g/ha).
--	--

SPÄTHS ALBRUBIN

Anthocyanhaltiger Rotdinkel - einzigartig auf dem Dinkelmarkt!

einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten

Winterdinkel: Backversuch (MRI)




16.03.2022

Winterdinkel

6

einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten

Winterdinkel: Backversuch (MRI)



16.03.2022

Winterdinkel

6


SPÄTHS ALBRUBIN

Anthocyanhaltiger Rotdinkel - einzigartig auf dem Dinkelmarkt!

hohe Fallzahlstabilität

©Wertprüfungsergebnisse

Winterdinkel: Fallzahl 2021



Quelle: Ergebnisse der offiziellen 3-jährigen Wertprüfung für Winterdinkel des Bundessortenamtes

© Wertprüfungsergebnisse

Winterdinkel

3


SPÄTHS ALBRUBIN

Anthocyanhaltiger Rotdinkel - einzigartig auf dem Dinkelmarkt!

hohe Fallzahlstabilität

©Wertprüfungsergebnisse

Winterdinkel: Fallzahl 2021



Quelle: Ergebnisse der offiziellen 3-jährigen Wertprüfung für Winterdinkel des Bundessortenamtes

16.03.2022

Winterdinkel

3

SPÄTHS ALBRUBIN

Anthocyanhaltiger Rotdinkel - einzigartig auf dem Dinkelmarkt!

Rotdinkel: Späths Albrubin

Qualität

2020 - 2021	Kernausbeute %	SDS Sedimentationsw. ml
Späths Albrubin	75	77
Zollernperle	74	80
Franckenkorn	74	82
Badensonne	74	65
Hohenloher	73	74
Keltenkraft	73	85
Alboretto	73	86
Badenglanz	71	65
Zollernspelz	71	78



Quelle: Ergebnisse der offiziellen 3-jährigen Wertprüfung für Winterdinkel des Bundessortenamtes

16.03.2022

Winterdinkel

4

Rotdinkel: Späths Albrubin

Qualität

2020 - 2021	Kernausbeute %	SDS Sedimentationsw. ml
Späths Albrubin	75	77
Zollernperle	74	80
Franckenkorn	74	82
Badensonne	74	65
Hohenloher	73	74
Keltenkraft	73	85
Alboretto	73	86
Badenglanz	71	65
Zollernspelz	71	78



Quelle: Ergebnisse der offiziellen 3-jährigen Wertprüfung für Winterdinkel des Bundessortenamtes

16.03.2022

Winterdinkel

4