

# SU AHAB<sup>E</sup>

## E-Sommerweizen mit Spitzenertrag

### Vorteile:

- ertragreicher Sommerweizen mit E-Qualität
- großkörniger Einzelährentyp mittlerer Reife mit guter Standfestigkeit und Auswuchsfestigkeit
- Sehr gute Trockentoleranz in den Dürrejahre 2018 und 2019!
- resistent gegen Orangerote Weizengallmücke

### Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

|               |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Ährenschieben |  |  |  |   | 5 |  |  |  |  |
| Reife         |  |  |  |   | 5 |  |  |  |  |
| Pflanzenlänge |  |  |  | 4 |   |  |  |  |  |

### Neigung zu

|       |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Lager |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

### Anfälligkeiten

|               |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Mehltau       |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Ährenfusarium |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Braunrost     |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Blattseptoria |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Gelbrost      |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

### Qualität

|                    |   |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Fallzahlstabilität | + |  |  |  |  |  |   |  |  |
| Rohproteingehalt   |   |  |  |  |  |  | 7 |  |  |

**Entwicklung:**

| Entwicklung          | Einzelährentyp mittlerer Reife |  |  |   |   |  |   |  |  |
|----------------------|--------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|
| Ährenschieben        |                                |  |  |   | 5 |  |   |  |  |
| Reife                |                                |  |  |   | 5 |  |   |  |  |
| Pflanzenlänge        |                                |  |  | 4 |   |  |   |  |  |
| Ähren/m <sup>2</sup> |                                |  |  | 4 |   |  |   |  |  |
| Körner/Ähre          |                                |  |  |   | 5 |  |   |  |  |
| TKM                  |                                |  |  |   |   |  | 7 |  |  |
| Kornertrag Stufe 1   |                                |  |  |   | 5 |  |   |  |  |
| Kornertrag Stufe 2   |                                |  |  |   | 5 |  |   |  |  |

**Vitalität und Gesundheit:**

|                 |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| Trockentoleranz |  |  |  |  |   |   |  |  | 9 |
| Lager           |  |  |  |  |   | 6 |  |  |   |
| Mehltau         |  |  |  |  | 5 |   |  |  |   |
| Gelbrost        |  |  |  |  | 5 |   |  |  |   |
| Braunrost       |  |  |  |  | 5 |   |  |  |   |
| Blattseptoria   |  |  |  |  | 5 |   |  |  |   |
| Ährenfusarium   |  |  |  |  | 5 |   |  |  |   |

**Vermarktung:**

|                    |   |  |  |  |  |  |   |  |   |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Fallzahl           |   |  |  |  |  |  | 8 |  |   |
| Fallzahlstabilität | + |  |  |  |  |  |   |  |   |
| Rohproteingehalt   |   |  |  |  |  |  | 7 |  |   |
| Sedimentationswert |   |  |  |  |  |  |   |  | 9 |

Kornertrag

Vergleichsweise sehr hohe Kornerträge (7/6) auf dem Niveau der leistungsfähigsten A-Sommerweizen, gleichzeitig sehr ertragstabil

# SU AHAB E

E-Sommerweizen mit Spitzenenertrag

Verarbeitung:

|                 |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| Volumenausbeute |  |  |  |  |  |   |  | 8 |  |
| Mehlausbeute    |  |  |  |  |  | 6 |  |   |  |
| Wasseraufnahme  |  |  |  |  |  |   |  | 8 |  |

# SU AHAB<sup>E</sup>

## E-Sommerweizen mit Spitzenertrag

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Anbauregionen | alle Standorte, auch in Trockenlagen           |
| Fruchtfolge   | vorzugsweise nach Blattfrucht, nicht nach Mais |

### Aussaat (Körner/m<sup>2</sup>):

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Aussaat    | saatzeitflexibel von sehr früh bis spät |
| Saattermin | möglichst früh bis Ende April           |

### Saatstärke (abhängig von den Aussaatbedingungen):

|                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frühjahrsaussaat | frühe Saat (Anfang März): ortsüblich, z. B. 370 - 380 Kö/m <sup>2</sup><br>mittlere Saat (Ende März): ortsüblich, z. B. 380 - 400 Kö/m <sup>2</sup><br>späte Saat (Mitte April): ortsüblich, z. B. 400 - 420 Kö/m <sup>2</sup> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### N-Düngung:

spätbetont : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 210 (Blattvorfrucht, hohes Ertragsniveau)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 60 - 80 inkl. N<sub>min 0-30</sub> mit 10 - 15 S zu Vegetationsbeginn

#### Schossgabe

EC 30 - 31: 50 - 70 inkl. N<sub>min 30-60</sub>, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 47 - 55: 70 - 90 (mit ca. 10 S) evtl. geteilt, Trockenstandorte eine Gabe bis EC 39

### Wachstumsregler:

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frühjahrsaussaat | Als mittelkurze, standfeste Sorte kann SU AHAB schonend mit etwas geringerer Dosierung eingekürzt werden<br>z.B. 0,5 CCC + 0,15 Moddus Start in EC 29 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise zum Pflanzenschutz | EC 32 prophylaktisch Kombimittel gegen Mehltau und Septoria<br>EC 47/51 Abschlussbehandlung mit Breitbandfungizid ODER<br>EC 61/63 Azolpräparat gegen Fusariosen bei hohem Infektionsdruck |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Züchter: Strube Research GmbH & Co. KG

Version: 11.09.2023 / 22.00

# SU AHAB E

E-Sommerweizen mit Spitzenenertrag

**Sommerweizen LSV Ostdeutschland**  
Angaben der Länderdienststellen  
Sommerweizen LSV Ostdeutschland

©nach Angaben der Länderdienststellen  
©nach Angaben der Länderdienststellen

## Erträge im Trockenjahr 2018

# SU AHAB<sup>E</sup>

E-Sommerweizen mit Spitzenenertrag

Erträge im Trockenjahr 2018