

SU VERGIL

Gesunder Populationsroggen für Körner- und Zweitfruchtnutzung



Vorteile:

- ertragsstarker Körnerroggen für den extensiven Anbau und ökologische Anbauverfahren
- hohe Eignung für den Zwischenfruchtanbau (Sommerbegrünung)
- zur Biomassenutzung auch im Gemenge mit Leguminosen (Sommerwicken) geeignet
- vergleichsweise hoher Rohproteingehalt und gute Aufwuchsfestigkeit

Anbau:

auch für extensive Anbauverfahren
auch Trockenstandorte, Moorböden und Höhenlagen

Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ährenschieben | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Reife | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pflanzenlänge | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |

Anfälligkeiten

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunrost | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Qualität

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahl | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | ■ | ■ | ■ |
| Proteingehalt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 7 | ■ | ■ |

Entwicklung und Ertrag

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körner / Ähre | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TKM | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kornertrag Stufe 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | ■ | ■ | ■ |
| Kornertrag Stufe 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ |