

# DURAMONTE

Bewährter, von Mühlen empfohlener Sommerdurum



## Vorteile:

- fallzahlstabiler Sommerdurum mittlerer Reife mit problemlosen Anbaueigenschaften
- sehr hohe Kornqualität
- sehr geringe Neigung zur Dunkelfleckigkeit
- sehr geringe DON-Werte

## Anbau:

rechtzeitige Saat

rechtzeitiger Fungizideinsatz

Fungizideinsatz gegen Blattkrankheiten auf Mehltau und Braunrost ausrichten

## Kurzprofil:

Bei in DE zugelassenen Sorten nach Beschreibender Sortenliste

1 = sehr niedrig/früh/kurz,

9 = sehr hoch/spät/lang

### Entwicklung



### Neigung zu



### Anfälligkeit



# DURAMONTE

Bewährter, von Mühlen empfohlener Sommerdurum

## Entwicklung:

Ährenschieben	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Druschreife	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Pflanzenlänge	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Ähren/m <sup>2</sup>	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Körner/Ähre	████	████	████	████	████	████	████	████	████
TKM	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Kornertrag Stufe 1	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Kornertrag Stufe 2	████	████	████	████	████	████	████	████	████

## Vitalität und Gesundheit:

Standfestigkeit	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Gelbrost	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Fusariumresistenz	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Mehltau	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Braunrost	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Blattseptoria	████	████	████	████	████	████	████	████	████

## Qualität:

Qualität	Hohe Fallzahlstabilität, wenig Dunkelfleckigkeit, gute Farbwerte								
Rohproteingehalt	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Dunkelfleckigkeit	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Gelbpigmentgehalt	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Kochpotenzial	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Glasigkeit	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Fallzahl	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Farbton Teigware	████	████	████	████	████	████	████	████	████
Sortierung	████	████	████	████	████	████	████	████	████

# DURAMONTE

## Bewährter, von Mühlen empfohlener Sommerdurum

Anbauregionen Mittlere und bessere Böden in sommerwarmen und sommertrockenen Durumlagen

### Aussaat:

Aussaat	So früh wie möglich bis Anfang April
Saatzeittoleranz	Optimale Saattermine begünstigen Ertrag und Qualität
ungünstige Bedingungen	400-450 Kö/m <sup>2</sup>
günstige Bedingungen	370-400 Kö/m <sup>2</sup>

### N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 200 (Blattvorfrucht, mittelhohes Ertragsniveau)

#### Startgabe

EC 13 - 25: 70 - 90 inkl. N<sub>min 0-30</sub> mit 10 - 15 S zu Vegetationsbeginn

#### Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 80, üppige Bestände EC 32

#### Spätgabe

EC 49 - 59: 40 - 60 (mit ca. 10 S), Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler (nach § 18b)	Ohne Ausnahmegenehmigung erlaubt ist Moddus mit einer Aufwandmenge bis zu 0,6 l/ha in EC 31 - 39. (§ 18 PflSchG). Insbesondere zu den späteren Anwendungsterminen genügen deutlich geringere Aufwandmengen.
im Intensivanbau z.B.	EC 31-37: 0,2-0,3 Moddus

### Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch)	Fest eingeplant werden sollte eine rechtzeitige Fungizidbehandlung zur Mehltau- und Braunrostkontrolle. Bei kritischen Witterungsbedingungen - insbesondere Niederschlägen zur Ernte - ist zusätzlich eine Ährenbehandlung zur Fusariumprophylaxe empfehlenswert.
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# DURAMONTE

Bewährter, von Mühlen empfohlener Sommerdurum

LSV Bayern 2012/2013

## Sommerhartweizen LSV-Ergebnisse Bayern

Sorte	Züchter / Vertrieb	Zuf. Land Jahr	Kornertrag relativ				
			2009	2010	2011	2012	2013
Durabon	Dr. Alter	1999	111	-	100	102	97
Durasol	Dr. Alter	2008	90	94	99	100	105
Durabelle	Dr. Alter	2013	-	-	-	-	90
Duroflavus*	Saatzucht Donau / IGZ	A 2007	100	98	94	93	96
Miradoux*	Desprez / SW Seed	F 2007	-	107	100	106	106
Malvadur*	Saatzucht Donau / Hauptsaat der Rheinprovinz	A 2010	-	-	103	92	106
Duramonte*	Südwestdeutsche Saatzeitung / Saaten Union	E 2010	-	-	-	113	105
Duromax*	Saatzeitung Donau	A 2011	-	-	-	93	94
Ducados*	Südwestdeutsche Saatzeitung / Saaten Union	E 2010	-	-	-	-	104
Nicodur*	Saatzeitung Donau / Intersaatzeitung	A 2011	99	102	98	93	97
<b>Mittel dt/ha</b>			<b>55,0</b>	<b>70,3</b>	<b>53,0</b>	<b>61,4</b>	<b>73,3</b>
<b>Anhang</b>							
Durabelle**	Dr. Alter						93
Zahl der Versuche			1	1	1	1	1

\* in einem anderen EU-Land eingetragen

\*\*nicht im Mittel: um 10 % erhöhte Aussaatstärke



IPZ 2a/SGVB – Dezember 2013

## Duramonte Eigenschaften lt. Lfl

### Sortenbeschreibung SOMMERHARTWEIZEN

Versuch 138, Ernte 2013

Sorte	Ertrag		Ertragskomponenten		Wachstumsmerkmale			Resistenz gegen			Qualität		
	extensiv	intensiv	TKG	Best.-dichte	Wuchslänge	Standfestigkeit	Reife	Braunrost	Blattsept.	Mehltau	Gelbpigment	Glasigkeit	Dunkelfleckigkeit
<b>mehrfährig geprüft</b>													
Durabon	o	(+)	(-)	o	o	(+)	o	(-)	o	(-)	+	+	+
Durasol	(+)	o	+	o	(-)	o	o	o	(+)	(+)	+	++	-
Durabelle	(-)	(-)	+++	(-)	(-)	(+)	o	o	(+)	+	(+)	++	-
Duroflavus EU	o	o	o	o	(+)	(+)	o	o	(+)	+	+++	+++	(+)
Miradoux EU	(+)	(+)	+	(-)	o	o	o	o	(+)	(+)	++	+	+
Malvadur EU <sup>1)</sup>	(+)	(+)	+	(+)	(-)	o	o	o	(+)	+	+	+	*
Duramonte EU <sup>2)</sup>	o	+	(-)	o	o	(+)	o	(-)	(+)	-	+	+	++
Duromax EU <sup>3)</sup>	*	*	(+)	*	(+)	(+)	o	(+)	o	++	o	+	*
<b>einjährig geprüft</b>													
Ducados EU <sup>3)</sup>	(+)	++	(-)	o	o	(+)	(+)	o	(+)	(+)	+++	+	o
Nicodur EU <sup>1)</sup>	*	*	o	*	o	-	o	(+)	o	++	+	++	*

Einstufung nach BSL 2013

<sup>1)</sup> Einstufung anhand der österreichischen Beschreibenden Sortenliste 2013

<sup>2)</sup> Einstufung anhand der WP1 und WP2

<sup>3)</sup> Einstufung anhand der WP1

EU: in einem europäischen Land zugelassen

\* keine Einstufung

+++ = sehr guthochfrüh/kurz, ++ = gut bis sehr gut, hoch bis sehr hoch, früh bis sehr früh, kurz bis sehr kurz, + = guthochfrüh/kurz, (+) = mittel bis guthochfrüh/kurz

o = mittel, (-) = mittel bis schlechtlagerungs/pfäntang, - = schlechtlagerungs/pfäntang



IPZ 2a/SGVB – Dezember 2013

Züchter: Südwestdeutsche Saatzeitung GmbH & Co. KG

Version: 27.07.2021 / 28.00